مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

المادة: الرياضيات

ملخص لدرس اللوغاريتم النيبيري

مستوى: السنة الثانية من سلك الباكالوريا

- شعبة التعليم الأصيل: مسلك العلوم الشرعية و مسلك اللغة العربية
- شعبة الآداب و العلوم الإنسانية: مسلك الآداب و مسلك العلوم الإنسانية

1) تعريف:

- دالة اللوغاريتم النيبيري يرمز لها ب ln و هي الدالة الأصلية للدالة $x \to \frac{1}{x}$ على المجال $]0,+\infty[$ التي تنعدم في 1.

و لدينا: $(\forall x \in]0,+\infty[) : \ln'(x) = \frac{1}{x}$

- دالة اللوغاريتم النيبيري تنعدم في 1 أي $\ln(1) = 0$.

2) النهايات: تقبل النهايات التالية:

الخاصية 1: $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x) = +\infty$

الخاصية 2: $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$

3) خاصية جبرية:

1. $(\forall a \succ 0)(\forall b \succ 0)$
2. $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
3. $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$
4. $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
5. $\ln\left(\sqrt{a}\right) = \frac{1}{2}\ln(a)$
6. $(\forall n \in \mathbb{Z}) \ln\left(a^n\right) = n\ln(a)$

تطبيق الخاصية 1:

لدينا $\ln(2) \simeq 0,7$

و $\ln(3) \simeq 1,1$

اذن:

$$\ln(6) = \ln(2\times 3)$$
$$= \ln(2) + \ln(3)$$
$$\simeq 0,7 + 1,1 \simeq 1,8$$

تطبيق خاصيات اللوغاريتم النيبيري:

مثال : إذا علمت أن $\ln(2) \simeq 0,7$ و $\ln(3) \simeq 1,1$ فاحسب ما يلي:

$\ln\left(\frac{8}{12}\right)$ $\ln(72)$ $\ln\left(\sqrt{6}\right)$ $\ln\left(\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}\right)$ $\ln\left(3\sqrt{2}\right)$

الحل:

$$\ln\left(\frac{8}{12}\right) = \ln\left(\frac{2\times 4}{3\times 4}\right) = \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$
$$= \ln(2) - \ln(3)$$
$$= 0,7 - 1,1 = -0,4$$

$$\ln(72) = \ln(9\times 8) = \ln(9) + \ln(8)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$72 = 9\times 8$$

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

$$\ln(ab)=\ln(a)+\ln(b)$$

$$\ln(a^n)=n\ln(a)$$

$$\ln(\sqrt{a})=\frac{1}{2}\ln(a)$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}\times3\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}}{2\sqrt{3}\times\sqrt{3}\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\ln(ab)=\ln(a)+\ln(b)$$
$$\ln(\sqrt{a})=\frac{1}{2}\ln(a)$$

$$(\forall a\succ 0)(\forall b\succ 0)$$
$$\ln(a)=\ln(b)\Leftrightarrow a=b$$
$$(\forall a\succ 0)(\forall b\succ 0)$$
$$\ln(a)\succ\ln(b)\Leftrightarrow a\succ b$$
$$\ln(a)\prec\ln(b)\Leftrightarrow a\prec b$$
لأن الدالة ln تزايدية قطعا.

$$\ln(e^3)=3$$
$$\ln(e^4)=-4$$
حل المعادلة $\ln(x)=7$
هو العدد $x=e^7$

$$=\ln(3^2)+\ln(2^3)$$
$$=2\ln(3)+3\ln(2)$$
$$=2\times(1,1)+3\times(0,7)$$
$$=2,2+2,1=4,3$$

$$\ln(\sqrt{6})=\frac{1}{2}\ln(6)=\frac{1}{2}\ln(2\times3)$$
$$=\frac{1}{2}(\ln(2)+\ln(3))=\frac{1}{2}(0,7+1,1)$$
$$=\frac{1}{2}(1,8)=0,9$$

$$\ln\left(\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}\right)=\ln\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$$
$$=\frac{1}{2}(\ln(3)-\ln(2))$$
$$=\frac{1}{2}(1,1-0,7)=\frac{1}{2}\times0,4=0,2$$
$$\ln(3\sqrt{2})=\ln(3)+\ln(\sqrt{2})$$
$$=\ln(3)+\frac{1}{2}\ln(2)$$
$$=1,1+\frac{1}{2}(0,7)$$
$$=1,1+0,35=1,45$$

4) جدول تغيرات الدالة $x\to\ln(x)$:

لدينا: $(\forall x\in]0,+\infty[):\ln'(x)=\frac{1}{x}$

بما أن $x\succ 0$ فان $(\forall x\in]0,+\infty[):\ln'(x)=\frac{1}{x}\succ 0$

و بالتالي الدالة ln تزايدية قطعا على $]0,+\infty[$

و منه الجدول:

x	0		$+\infty$
f'	‖	+	
f(x)	‖	↗	$+\infty$
	$-\infty$		

5) العدد e **:** $e\simeq 2,71828\cdots$

← e هو العدد الحقيقي الذي يحقق $\ln(e)=1$.

← بتطبيق الخاصية الخامسة على العدد e


نحصل على: $(\forall n\in\mathbb{Z})\ln(e^n)=n\ln(e)$

أي: $(\forall n\in\mathbb{Z})\ln(e^n)=n$

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

6) منحنى الدالة ln في معلم متعامد ممنظم



ملاحظات:

معادلة مماس المنحنى الدالة ln في النقطة $(1,0)$ هي:

$$y=\ln'(1)(x-1)+\ln(1)$$

أي: $y=x-1$

معادلة مماس المنحنى الدالة ln في النقطة $(e,0)$ هي:

$$y=\ln'(e)(x-e)+\ln(e)$$

أي: $y=\frac{1}{e}(x-e)+1$

أي: $y=\frac{1}{e}x$

$$\ln'(x)=\frac{1}{x}$$
$$\ln'(1)=\frac{1}{1}=1$$
$$\ln(1)=0$$
$$\ln'(e)=\frac{1}{e}$$
$$\ln(e)=1$$

منحنى الدالة ln يوجد تحت محور الأفاصيل في المجال $]0,1[$ و هذا يعني أن $(\forall x\in]0,1[):\ln(x)\prec 0$.

منحنى الدالة ln يوجد تحت محور الأفاصيل في المجال $]1,+\infty[$ و هذا يعني أن $(\forall x\in]1,+\infty[):\ln(x)\succ 0$.

7) اللوغاريتم العشري:

تعريف:

يرمز لدالة اللوغاريتم العشري ب: log و هي معرفة على $]0,+\infty[$

كما يلي: $(\forall x\in]0,+\infty[):\log(x)\frac{\ln(x)}{\ln(10)}$

لاحظ أن $\ln(10)\neq 1$
في حين $\log(10)=1$

خاصيات هامة لدالة اللوغاريتم العشري:

1. $\log(1)=0$ و $\log(10)=1$
2. $(\forall a\succ 0)(\forall b\succ 0):\log(a\times b)=\log(a)+\log(b)$
3. $(\forall a\succ 0):\log\left(\frac{1}{b}\right)=-\log(b)$
4. $(\forall a\succ 0)(\forall b\succ 0):\log\left(\frac{a}{b}\right)=\log(a)-\log(b)$
5. $(\forall a\succ 0)(\forall n\in\mathbb{Z}):\log(a^n)=n\log(a)$
6. $(\forall n\in\mathbb{Z}):\log(10^n)=n$
7. $(\forall x\in]0,+\infty[):\log'(x)=\frac{1}{x\ln(10)}$

تطبيق الخاصية 2:

نريد حساب $\log(20)$

علما أن $\log(2)\simeq 0,30103$

$$\log(20)=\log(2\times 10)$$
$$=\log(2)+\log(10)$$
$$\simeq 0,30103+1$$
$$\simeq 1,30103$$

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

8. $\lim\limits_{x\to+\infty}\log(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\log(x)=-\infty$

9. إذا كان $10^c\le x\prec 10^{c+1}$ فان $c\le\log(x)\prec c+1$

10. $(\forall a\succ 0)(\forall b\succ 0):\log(a)=\log(b)\Leftrightarrow a=b$

11. $(\forall a\succ 0)(\forall b\succ 0):\log(a)\succ\log(b)\Leftrightarrow a\succ b$

نضع: $x=104,27$
لدينا: $100\le x\le 1000$
أي: $10^2\le x\prec 10^3$
إذن: $2\le\log(x)\prec 3$
أي: $\log(x)\simeq 2,\cdots\cdots$

جدول تغيرات دالة اللوغاريتم العشري:

x	0		$+\infty$
f'	||	+	
f(x)	|| $-\infty$	↗	$+\infty$

تطبيق خاصيات اللوغاريتم النيبري: المعادلات:

مثال : حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

1) $\ln(x)=0$ 2) $\ln(x)=1$ 3) $\ln(x)=7$

4) $\ln(x+1)=\ln(3)$ 5) $\ln(x-1)=\ln(2x+3)$ 6) $\ln(x)+\ln(4-x)=\ln(6-x)$

الحل:

1) يجب أن يكون $x\succ 0$ في المعادلة $\ln(x)=0$

و منه مجموعة تعريف هذه المعادلة هي $]0,+\infty[$

المعادلة $\ln(x)=0$ تكافئ $\ln(x)=\ln(1)$

و منه $x=1$ و بما أن $1\in]0,+\infty[$

فان مجموعة حلول المعادلة هي: $S=\{1\}$

2) مجموعة تعريف المعادلة $\ln(x)=1$ هي $]0,+\infty[$

و هي تكافئ $\ln(x)=\ln(e)$ أي $x=e$

و بما أن $e\in]0,+\infty[$ فان $S=\{e\}$

3) مجموعة تعريف المعادلة $\ln(x)=7$ هي $]0,+\infty[$

و هي تكافئ $\ln(x)=\ln(e^7)$ أي $x=e^7$

و بما أن $e^7\in]0,+\infty[$ فان $S=\{e^7\}$.

4) يجب أن يكون $x+1\succ 0$ أي $x\succ -1$

و منه مجموعة تعريف المعادلة $\ln(x+1)=\ln(3)$ هي $]-1,+\infty[$

المعادلة تكافئ $x+1=3$ أي $x=2$

و بما أن $2\in]-1,+\infty[$ فان $S=\{2\}$

5) يجب أن يكون $x-1\succ 0$ و $2x+3\succ 0$

أي $x\succ 1$ و $2x\succ -3$ أي $x\succ 1$ و $x\succ -\frac{3}{2}$ أي $x\succ 1$

و منه مجموعة تعريف المعادلة $\ln(x-1)=\ln(2x+3)$

هي $]1,+\infty[$ و هي تكافئ $x-1=2x+3$ أي $x=-4$


و بما أن $-4\notin]1,+\infty[$ فان $S=\phi$

الكتابة $\ln(x)$ لها معنى إذا كان $x\succ 0$.

$\ln(1)=0$.

$7=\ln(e^7)$


$(\forall n\in\mathbb{Z}):\ln(e^n)=n$.



للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

6) يجب أن يكون $0 \prec x$ و $0 \prec 4-x$ و $0 \prec 6-x$.
أي $0 \prec x$ و $4 \prec x$ و $6 \succ x$.
و منه مجموعة تعريف المعادلة $\ln(x)+\ln(4-x)=\ln(6-x)$ هي $]0,4[$ و هي تكافئ $\ln[x(4-x)]=\ln(6-x)$



$0 \prec x$ و $4 \succ x$ و $6 \succ x$ يكافئ $0 \prec x \prec 4$.

أي $x(4-x)=6-x$
أي $4x-x^2=6-x$ أي $x^2-5x+6=0$
و هذه الأخيرة معادلة من الدرجة الثانية يتم حلها بحساب المميز Δ

$ax^2+bx+c=0$
$\downarrow$
$\Delta=b^2-4ac$

إذا كان $\Delta \succ 0$ فان المعادلة $ax^2+bx+c=0$ تقبل حلين مختلفين
$x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$

$\Delta=(-5)^2-4(1)(6)=25-24=1$
لدينا $\sqrt{\Delta}=1$ و منه المعادلة $x^2-5x+6=0$ تقبل حلين مختلفين $x_1=\dfrac{5-1}{2}=2$ و $x_2=\dfrac{5+1}{2}=3$.
و بما أن $2 \in]0,4[$ و $3 \in]0,4[$
فان مجموعة حلول المعادلة $\ln(x)+\ln(4-x)=\ln(6-x)$ هي: $S=\{2,3\}$

تطبيق خاصيات اللوغاريتم النيبري: دراسة دالة تحتوي صيغتها على اللوغاريتم النيبري:

مثال :

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0,+\infty[$ ب: $f(x)=x\ln x-x+1$ $(\forall x \in]0,+\infty[)$

1. أحسب $f(1)$ و $f(e)$ و $f(4)$ و $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$ علما أن $\ln(2) \simeq 0,69$ و $\ln(3) \simeq 1,1$ و $e \simeq 2,71$.
2. أحسب $f'(x)$ لكل x من $]0,+\infty[$.
3. أعط جدول تغيرات الدالة f.
4. حدد معادلة مماس (C_f) في 4.

الحل:

1. $f(1)=1\ln(1)-1+1=0$

$\ln(1)=0$

$f(e)=e\ln(e)-r+1$
$=e\times 1-e+1$
$=e-e+1=1$

$\ln(e)=1$

$f(4)=4\ln(4)-4+1$
$=4\ln(2^2)-4+1$

$\ln(2^2)=2\ln(2)$

$=8\ln(2)-3$
$=8\times 0,69-3=2,52$

$f\left(\dfrac{1}{3}\right)=-\ln(3) \simeq -1,1$

$\ln\left(\dfrac{1}{x}\right)=-\ln(x)$

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

2. حساب $f'(x)$:

$$f'(x)=(x\ln(x)-x+1)$$
$$=(x\ln(x))'-(x)'+(1)'$$
$$=(x)'\ln(x)+x\cdot\ln'(x)-1+0$$
$$=\ln(x)+1-1$$

$$\boxed{f'(x)=\ln(x)}$$

3. معادلة المماس عند النقطة ذات الأفصول 4

هي: $y=f'(4)(x-4)+f(4)$

أي $y=1,38x-3$ لأن $f(4)=2,25$ و $f'(4)=1,38$.

معادلة المماس عند النقطة ذات الأفصول 1

هي: $y=f'(1)(x-1)+f(1)$

أي $y=0$ لأن $f(1)=0$ و $f'(1)=0$

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0,+\infty[$ ب : $f(x)=2\ln(x)-x$

أعط جدول تغيرات الدالة f على المجال $]0,3[$

أنشئ (C_f) منحنى الدالة f في معلم متعامد ممنظم على المجال $]0,3[$.

الحل:

لدينا $\lim\limits_{x\to0^+}\ln(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to0^+}x=0$ اذن $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$.

$f'(x)=\frac{2}{x}-1=\frac{2-x}{x}$ اشارة $f'(x)$ هي اشارة $(2-x)$ لأن x موجب قطعا.

و منه جدول تغيرات f هو كما يلي:

x	0		2		3
f'(x)	‖	+	0	-	
f(x)	‖-∞	↗	-0,6	↘	-0,8

الأستاذ: نجيب عثماني

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com