مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ

❖ لنعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $D_f = \left[\frac{-35}{2};+\infty\right[$ بما يلي : $f(x)=\sqrt{2x+35}$. الرسم أسفله (C_f)


يمثل منحنى للدالة f و المستقيم (Δ) ذو المعادلة : $y=x$ في معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{i},\vec{j})$.

❖ لنعتبر المتتالية $(u_n)_{n\geq 0}$: $u_{n+1}=\sqrt{2u_n+35}$; $n\geq 0$ و $u_0=-13$.

- الطريقة 1 : لمعرفة نهاية u_n مبيانيا .

01. نمثل على محور الأفاصيل النقط A_0 و A_1 و A_2 و A_3 و A_4 التي أراتبها منعدمة و أفاصيلها هي u_0 و u_1 و u_2 و u_3 و u_4 على التوالي . مع $u_1=3$ و $u_2\simeq 6,403$ و $u_3\simeq 6,914$ و $u_4\simeq 6,988$.

على المنحنى ضع المسلك الذي نتبعه للحصول على قيم هذه الحدود و هي ممثلة على محور الأفاصيل بدون استعمال قيم u_1 و u_2 و u_3 و u_4.



02. ما هو التظنن الذي نحصل عليه ؟

- المتتالية u_n تزايدية .
- المتتالية u_n مكبورة ب 7 .
- الحدود u_n محصورة بين 13- و 7 أي $-13\leq u_n\leq 7$, $\forall n\in\mathbb{N}$ و كذلك الحدود ماعدا $u_0=-13$ محصورة بين 3 و 7 أي $3\leq u_n\leq 7$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$
- المتتالية متقاربة .

نهاية المتتالية هي 7 .

- الطريقة 2 لتحديد نهاية u_n .

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ

01. ...

أ- أحسب f' الدالة المشتقة ل f على $D_f = \left]\frac{-35}{2};+\infty\right[$.

لدينا : $f'(x)=\left(\sqrt{2x+35}\right)'=\frac{(2x+35)'}{2\sqrt{2x+35}}=\frac{1}{\sqrt{2x+35}}$

ب- أعط جدول تغيرات f على D_f .

نعطي جدول تغيرات f على $\mathbb{R}$.

جدول تغيرات الدالة f .

x	$-\frac{35}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$		$\nearrow$	$+\infty$
	0		

02. لنعتبر المجال $I=[3;7]$ نتحقق بأن $f(I)\subset I$.

لدينا :

- الدالة f متصلة على $I=[3;7]$
- الدالة f تزايدية قطعا على $I=[3;7]$

ومنه : $f([3;7])=[f(3),f(7)]=\left[\sqrt{41};7\right]\subset[3;7]$.

خلاصة : $f(I)\subset I$

03. ...

أ- نبين ان : $\forall n\in\mathbb{N}^*\ ,\ 3\le u_n\le 7$.

لدينا :

نستدل على ذلك بالترجع :

- نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n=1$.

لدينا : $u_1=3$ ومنه : $3\le u_1=3\le 7$ و بالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $n=1$.

- نفترض أن العلاقة صحيحة إلى n أي $3\le u_n\le 7$ صحيحة (معطيات الترجع)
- نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن : $0\le u_{n+1}\le 1$.

لدينا : حسب معطيات الترجع $3\le u_n\le 7\Rightarrow 2\times 3\le 2\times u_n\le 2\times 7$.

$\Rightarrow 2\times 3+35\le 2\times u_n+35\le 2\times 7+35$

$\Rightarrow \sqrt{2\times 3+35}\le\sqrt{2\times u_n+35}\le\sqrt{2\times 7+35}$

$\Rightarrow 3\le\sqrt{41}\le u_{n+1}\le 7$; $\left(3\le\sqrt{41}\ ;\ \sqrt{49}=7\right)$

$\Rightarrow 3\le u_{n+1}\le 7$

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

ومنه : $3 \le u_{n+1} \le 7$

إذن العلاقة صحيحة ل $n+1$.

خلاصة : $\forall n \in \mathbb{N}^* \ : \ 3 \le u_n \le 7$

ب- بين أن المتتالية تزايدية .

نبين أن : $\forall n \in \mathbb{N} \ ; \ u_n \le u_{n+1}$

نستدل على ذلك بالترجع :

- نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n=0$.

لدينا : $u_1 = 3$ و $u_0 = -13$ ومنه : $u_0 \le u_1$ و بالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $n=0$.

- نفترض أن العلاقة صحيحة إلى $n-1$ أي $u_{n-1} \le u_n$ صحيحة (معطيات الترجع)

- نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن : $u_n \le u_{n+1}$.

لدينا : حسب معطيات الترجع $u_{n-1} \le u_n \Rightarrow f(u_{n-1}) \le f(u_n)$ (لأن f تزايدية على $I=[3;7]$)

$\Rightarrow u_n \le u_{n+1}$

ومنه : العلاقة صحيحة ل $n+1$.

و بالتالي : $\forall n \in \mathbb{N} \ ; \ u_n \le u_{n+1}$

خلاصة : u_n تزايدية

ملحوظة : يمكن دراسة إشارة الفرق ل $u_{n+1} - u_n$ وهذه الطريقة تستعمل فقط في بعض الدوال حيث صيغتها بسيطة .

ج- بين أن: (u_n) لها نهاية منتهية ℓ .

لدينا :

- $u_n \le 7$ حسب ما سبق إذن u_n مكبورة ب 7 .
- u_n تزايدية.
- u_n متقارب (حسب خاصية) .

خلاصة : u_n متقارب إذن لها نهاية منتهية .

د- بين أن : $\ell \ge 3$.

بما أن جميع الحدود ما عدا u_0 محصورة بين 3 و 7 إذن ℓ نهاية u_n تحقق $\ell \ge 3$

ه- حدد قيمة ℓ .

لدينا :

- الدالة f متصلة على $I=[3;7]$.
- $f([3;7]) \subset [3;7]$.
- $u_1 = 3 \in [3;7]$.
- u_n متقارب .

إذن : ℓ نهاية u_n هي حل للمعادلة $f(x)=x$; $x \in [3;7]$.

نحل المعادلة :

لدينا :

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

$$f(x)=x \Leftrightarrow \sqrt{2x+35}=x$$
$$\Leftrightarrow 2x+35=x^2$$
$$\Leftrightarrow x^2-2x-35=0$$
$$\Leftrightarrow x=7\in[3;7] \quad \vee \quad x=-5\notin[3;7]$$

ومنه : $\ell=7$

خلاصة : قيمة ℓ نهاية المتتالية (u_n) هي $\ell=7$.

- الطريقة 3 :

01. ...

أ- نبين أن : $\forall n\in\mathbb{N}\ ;\ u_{n+1}-7=\dfrac{2(u_n-7)}{\sqrt{2u_n+35}+7}$.

لدينا :

$$u_{n+1}-7=\sqrt{2u_n+35}-7=\frac{\left(\sqrt{2u_n+35}-7\right)\left(\sqrt{2u_n+35}+7\right)}{\sqrt{2u_n+35}+7}=\frac{(2u_n+35)-49}{\sqrt{2u_n+35}+7}=\frac{2(u_n-7)}{\sqrt{2u_n+35}+7}$$

خلاصة : $\forall n\in\mathbb{N}\ ;\ u_{n+1}-7=\dfrac{2(u_n-7)}{\sqrt{2u_n+35}+7}$

ب- نستنتج أن : $\forall n\in\mathbb{N}^*\ ;\ |u_{n+1}-7|\le\frac{2}{7}|u_n-7|$.

لدينا

$$\sqrt{2u_n+35}\ge 0\Rightarrow\sqrt{2u_n+35}+7\ge 7$$
$$\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{2u_n+35}+7}\le\frac{1}{7}$$
$$\Rightarrow 2|u_n-7|\times\frac{1}{\sqrt{2u_n+35}+7}\le 2|u_n-7|\times\frac{1}{7}\quad ;\quad \left(2|u_n-7|\ge 0\right)u_{n+1}-7=\frac{2(u_n-7)}{\sqrt{2u_n+35}+7}$$
$$\Rightarrow|u_{n+1}-7|\le\frac{2}{7}\times|u_n-7|\quad ;\quad \left(u_{n+1}-7=\frac{2(u_n-7)}{\sqrt{2u_n+35}+7}\right)$$

ومنه : $|u_{n+1}-7|\le\frac{2}{7}\times|u_n-7|$

خلاصة : $\forall n\in\mathbb{N}^*\ ;\ |u_{n+1}-7|\le\frac{2}{7}|u_n-7|$

ج- نبين بالترجع : $\forall n\in\mathbb{N}^*\ ;\ |u_n-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n$.

نستدل على ذلك بالترجع :

- نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n=1$.

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ

لدينا : $|u_1-7|=|3-7|=4\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^1$ و بالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $n=1$.

- نفترض أن العلاقة صحيحة إلى n أي $|u_n-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n$ صحيحة (معطيات الترجع)
- نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن : $|u_{n+1}-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^{n+1}$.

لدينا :

- $|u_{n+1}-7|\le\frac{2}{7}\times|u_n-7|$ (حسب السؤال السابق) (1).
- حسب معطيات الترجع $|u_n-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n$. (2) .
- من خلال العلاقتين (1) و (2) نستنتج أن : $|u_{n+1}-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^{n+1}\Rightarrow|u_{n+1}-7|\le\frac{2}{7}\times|u_n-7|\le\frac{2}{7}\times 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n$.

ومنه : $|u_{n+1}-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^{n+1}$

ومنه : العلاقة صحيحة ل $n+1$.

و بالتالي : $\forall n\in\mathbb{N}^*\ ;\ |u_n-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n$

خلاصة : $\forall n\in\mathbb{N}^*\ ;\ |u_n-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n$

د- نستنتج نهاية u_n عندما يؤول n إلى $+\infty$.

لدينا :

- $\forall n\in\mathbb{N}^*\ ;\ |u_n-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n$. $\forall n\in\mathbb{N}^*$ (حسب السؤال السابق) ومنه : $\forall n\in\mathbb{N}^*\ ;\ 0\le|u_n-7|\le 4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n$
- لدينا : $\lim\limits_{n\to+\infty}4\times\left(\frac{2}{7}\right)^n=0$ (لأن $-1<\frac{2}{7}<1$) .
- إذن : $\lim\limits_{n\to+\infty}|u_n-7|=0$ (حسب أحد مصادق التقارب) و منه : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n-7=0$ ومنه : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=7$.

خلاصة : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=7$

.02

لنعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي : $f(x)=\frac{6x}{x^3+4}$.

.01 ...

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com


الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ

أ- نحدد مجموعة تعريف الدالة f .

لدينا :

$$x \in D_f \Leftrightarrow x^3+4 \neq 0$$
$$\Leftrightarrow -x^3 \neq 4$$
$$\Leftrightarrow (-x)^3 \neq 4$$
$$\Leftrightarrow (-x) \neq \sqrt[3]{4}$$
$$\Leftrightarrow x \neq -\sqrt[3]{4}$$

خلاصة : مجموعة تعريف الدالة f هي : $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\sqrt[3]{4}\right\}$.



ب- ضع جدول لتغيرات الدالة f .

لدينا : $f'(x) = \left(\frac{6x}{x^3+4}\right)' = \frac{-12\left(x^3-2\right)}{\left(x^3+4\right)^2}$

جدول تغيرات الدالة f هو كالتالي .

x	$-\infty$		$-\sqrt[3]{4}$		$\sqrt[3]{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$\sqrt[3]{2}$	↘	0

ج- حدد $f\left(\left[1;\sqrt[3]{2}\right]\right)$.

لدينا :

- الدالة f متصلة على $I = \left[0;\sqrt[3]{2}\right]$
- الدالة f تزايدية قطعا على $I = \left[1;\sqrt[3]{2}\right]$

ومنه : $f\left(\left[1;\sqrt[3]{2}\right]\right) = \left[f(1), f\left(\sqrt[3]{2}\right)\right] = \left[\frac{6}{5};\sqrt[3]{2}\right] \subset \left[1;\sqrt[3]{2}\right]$.

خلاصة : $f(I) \subset I$

02. لنعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بما يلي : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \; ; \; n \in \mathbb{N} \end{cases}$

أ- بين بالترجع : $\forall n \in \mathbb{N} \; ; \; 1 \leq u_n < \sqrt[3]{2}$.

لدينا :

نستدل على ذلك بالترجع :

- نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n = 0$.

لدينا : $u_0 = 1$ ومنه : $1 \leq u_0 = 1 \leq \sqrt[3]{2}$ و بالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $n = 0$.

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

- نفترض أن العلاقة صحيحة إلى n أي $1 \le u_n < \sqrt[3]{2}$ صحيحة (معطيات الترجع)
- نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن : $1 \le u_{n+1} < \sqrt[3]{2}$.

لدينا : حسب معطيات الترجع : $1 \le u_n < \sqrt[3]{2} \Rightarrow f(1) \le f(u_n) \le f\left(\sqrt[3]{2}\right)$.

$\Rightarrow \frac{6}{5} \le u_{n+1} \le \sqrt[3]{2}$

(لأن الدالة f تزايدية على $I = \left[0;\sqrt[3]{2}\right]$)

$\Rightarrow 1 \le \frac{6}{5} \le u_{n+1} \le \sqrt[3]{2}$

ومنه : $1 \le u_{n+1} < \sqrt[3]{2}$

إذن العلاقة صحيحة ل $n+1$.

خلاصة : $\forall n \in \mathbb{N} \; ; \; 1 \le u_n < \sqrt[3]{2}$

ب- أدرس رتابة المتتالية (u_n) ثم استنتج تقارب المتتالية (u_n).

نبين أن : $\forall n \in \mathbb{N} \; ; \; u_n \le u_{n+1}$

نستدل على ذلك بالترجع :

- نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n = 0$.

لدينا : $u_1 = \frac{6}{5}$ و $u_0 = 1$ ومنه : $u_0 \le u_1$ و بالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $n = 0$.

- نفترض أن العلاقة صحيحة إلى $n-1$ أي $u_{n-1} \le u_n$ صحيحة (معطيات الترجع)
- نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن : $u_n \le u_{n+1}$.

لدينا : حسب معطيات الترجع $u_{n-1} \le u_n \Rightarrow f(u_{n-1}) \le f(u_n)$ (لأن f تزايدية على $I = \left[1;\sqrt[3]{2}\right]$)

$\Rightarrow u_n \le u_{n+1}$

ومنه : العلاقة صحيحة ل $n+1$.

و بالتالي : $\forall n \in \mathbb{N} \; ; \; u_n \le u_{n+1}$

خلاصة : u_n تزايدية

ملحوظة : يمكن دراسة إشارة الفرق ل $u_{n+1} - u_n$ وهذه الطريقة تستعمل فقط في بعض الدوال حيث صيغتها بسيطة .

ج- حدد نهاية المتتالية (u_n) .

لدينا :

- الدالة f متصلة على $I = \left[1;\sqrt[3]{2}\right]$.
- $f\left(\left[1;\sqrt[3]{2}\right]\right) \subset \left[1;\sqrt[3]{2}\right]$.
- $u_0 = 1 \in \left[1;\sqrt[3]{2}\right]$.
- u_n متقارب .

إذن : ℓ نهاية u_n هي حل للمعادلة $f(x) = x$; $x \in \left[1;\sqrt[3]{2}\right]$.

نحل المعادلة :

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

لدينا :

$$f(x)=x \Leftrightarrow \frac{6x}{x^3+4}=x$$

$$\Leftrightarrow 6x=x\left(x^3+4\right)$$

$$\Leftrightarrow x\left(6-x^3-4\right)=0$$

$$\Leftrightarrow x\left(2-x^3\right)=0$$

$$\Leftrightarrow x=0 \notin \left[1;\sqrt[3]{2}\right] \quad \vee \quad x=\sqrt[3]{2} \in \left[1;\sqrt[3]{2}\right]$$

ومنه : $\ell=\sqrt[3]{2}$

خلاصة : قيمة ℓ نهاية المتتالية u_n هي $\ell=\sqrt[3]{2}$.

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com