مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي Madarisy.com

1/التمرين الأول.(6,5ن).

نترك جسما s كتلته m = 500g في النقطة A لينزلق على سكة ABCD(أنظر الشكل)بدون سرعة بدئية. يكتسب الجسم طاقة حركية في النقطة B قدرها E_{c_B}= 1J

$h = AA' = 1m$; $\alpha = 30°$.


1- بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية احسب شغل قوى الاحتكاك ثم استنتج قيمة قوة الاحتكاك بين السكة والجسم على الجزء AB.(0.75ن) .

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن اكتب عبارة التسارع ثم احسب قيمته العددية على الجزء AB.(0.75ن) .

3- اكتب المعادلة الزمنية لحركة الجسم s من A إلى B باعتبار A أصلا للأفاصيل ولحظة تسجيلها أصلا للتواريخ.(0.5ن) .

4-جواصل الجسم حركته في باقي المسار بدون احتكاك و يصل إلى النقطة D بسرعة $V_D = \frac{1}{2} V_B$.

$OC = OD = 2m$; $g = 10\ ms^{-2}$



4-1-بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية أوجد قيمة الزاوية β=(COD).(0.75ن)

4-2-أوجد شدة تأثير السكة CD على الجسم عند الموضع D. (1 ن)

5-يغادر الجسم السكة في اللحظة $t = 0$ عند D ليبقى تحت تأثير وزنه فقط .


5-1-أوجد معادلة المسار (x)y لحركة الجسم في المعلم (D,x,y).(0.75ن)

5-2-أحسب احداثيات قمة المسار H.(0.75ن)

5-3-أحسب لحظة وسرعة اصطدام الجسم بالمحور Dx. (1 ن)

التمرين الثاني 6,5 ن

يتكون نواس اللي من سلك فولاذي رأسي ثابتة ليه C مثبت من طرفه الأعلى في حامل ، ويحمل في طرفه الأسفل قضيبا متجانسا AB ، طوله $\ell = 2cm$ ، عزم قصوره بالنسبة لمحور رأسي هو $J_\Delta = 4.10^{-4} kg.m^2$.



ندير القضيب AB أفقيا حول المحور (Δ) في المنحى الموجب بالزاوية θ_m انطلاقا من موضع توازنه ، ثم نحرره بدون سرعة بدئية في اللحظة ذات التاريخ $t = 0$.


نعلم موضع القضيب في كل لحظة بأفصوله الزاوي θ . الذي نقيسه بالنسبة لموضع التوازن . نهمل جميع الاحتكاكات ونأخذ $\pi^2 = 10$.

1 ـ بتطبيق العلاقة الأساسية للتحريك ، أوجد المعادلة التفاضلية لحركة القضيب ، واستنتج تعبير الدور الخاص T_0 بدلالة J_Δ و C . (1 ن)

2 ـ باختيار موضع التوازن القضيب مرجعا لطاقة الوضع للي ، أوجد تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة { حامل ، سلك ، قضيب } بدلالة J_Δ و C والأفصول الزاوي θ والسرعة الزاوية $\dot{\theta}$. (1 ن)

3 ـ يمثل المبيان أسفله مخططي الطاقة الميكانيكية وطاقة وضع اللي للمجموعة .

باعتمادك على هذا المبيان أوجد :



3 ـ 1 القيمة القصوى لطاقة الوضع للي .

3 ـ 2 الوسع θ_m (0,75 ن)

3 ـ 3 ثابتة اللي للسلك C . (1ن)

4 ـ أعط المعادلة الزمنية لحركة القضيب . (0,75 ن)

5 ـ نثبت على القضيب وعلى نفس المسافة $d = \ell / 4$ من المحور (Δ) سحمتين مماثلتين كتلتيهما $m_1 = m_2 = m$. ونزيح القضيب عن موضع توازنه بنفس الزاوية θ_m ونحرره بدون سرعة بدئية .

أحسب الكتلة m ، علما أن المتذبذب ينجز 10ذبذبات خلال مدو $\Delta t = 15s$. (2 ن)

نعطي $J'_\Delta = J_\Delta + 2md^2$ عزم قصور المجموعة { القضيب ، السحمتين } بالنسبة للمحور Δ .

الكيمياء 7ن

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

Madarisy.com : مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي

عند اللحظة $t=0$ تم خلط $0,20mol$ من الحمض و $0,20mol$ من الكحول . تنجز هذا التفاعل بوجود حمض الكبريتيك وبواسطة التسخين بالارتداد .

1 ـ أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل الأسترة .

2 ـ نعرف التقدم x للتفاعل بكمية مادة الاستر المتكون خلال الزمن . أتمم الجدول الوصفي للتفاعل :

معادلة التفاعل		$acide$	+	$alcool$	→	$ester$	+	eau
الحالة	التقدم	كميات المادة						
البدئية	0	0,20		0,20		0		0
خلال التفاعل	x							
عند التوازن	$x_{éq}$							

3 ـ احسب التقدم الاقصى لتفاعل الاسترة إذا افترضنا ان التفاعل كلي .

4 تعطي التجربة التقدم عند التوازن للإستر - $x_{eq}=0,13mol$.

4 ـ 1 أتمم الجدول الوصفي للتفاعل

4 ـ 2 أحسب مردود هذا التحول

4 ـ 3 ما هو تعليقك على هذه القيمة ؟

5 ـ نعوض الكحول $R'-CH_2-OH$ ب $R_1-CHOH-R_2$

5 ـ 1 أعط الصيغة نصف المنشورة للإستر الناتج وحدد صنف الكحول المستعمل

5 ـ 2 علما أن مردود هذا التحول الجديد هو 60% ، أحسب القيمة الجديدة للتقدم عند التوازن

5 ـ 3 استنتج قيمة ثابتة التوازن باستعمال هذ الكحول الجديد

1- <u>التمرين الأول</u> :

1- في الجزء AB يخضع الجسم لوزنه $\vec{P}$ ولتأثير سطح التماس $\vec{R}$ مائلة في عكس منحى الحركة بزاوية φ لأن التماس يتم باحتكاك.

بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية عليه بين A و B :

$$\Delta Ec_{A\ >B}=\Sigma W\vec{F}_{A\ >B}$$


$$Ec_B - Ec_A = W\vec{P}_{A\ >B}+W\vec{R}_{A\ >B} \quad \text{مع} \quad Ec_A=0$$

$$Ec_B = W\vec{P}_{A\ >B}+W\vec{R}_{A\ >B}$$

$$W_{\vec{R}\ A\ >B} = Ec_B - W\vec{P}_{A\ >B}$$

$$W_{\vec{R}\ A\ >B} = Ec_B - mg\,(z_A - z_B)$$

$$AB=\frac{h}{\sin\alpha}=\frac{1m}{0,5}=2m \qquad z_B=h \qquad z_A=0$$



$$W_{\vec{R}\ A\ >B} = E_{c_B} - mgh = 1-0,5.(10).1 = -4J$$

ولدينا : $W_{\vec{R}\ A\ >B}=\vec{R}.\overrightarrow{AB}=(\vec{R}_T+\vec{R}_N).\overrightarrow{AB}=\vec{R}_T.\overrightarrow{AB}+\vec{R}_N.\overrightarrow{AB}=0+\overrightarrow{R_T}.\overrightarrow{AB}=\vec{R}_T.\overrightarrow{AB}=\ R_T.AB$

نعلم أن R_T هي قوة الاحتكاك ونرمز إليها ب: f .

إذن : $W_{\vec{R}\ A\ >B}=-f.AB$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع