Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي
Benmoussa Mohammed




DEFINITION

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nul de l'espace $(\mathcal{E})$; A et B et C trois points de $(\mathcal{E})$ tel que : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$; H est la projection de C sur la droite (AB) .

Si $\vec{u}=\vec{0}$ ou $\vec{v}=\vec{0}$ on a $\vec{u}.\vec{v}=0$


1ER cas le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$$\vec{u}.\vec{v}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB\times AH$$



2ième cas le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$$\vec{u}.\vec{v}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-AB\times AH$$



Remarque

- $\vec{u}.\vec{u}=\vec{u}^2$ est le carré scalaire de $\vec{u}$ est toujours positif .
- $\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=AB$ est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ on note : $\|\vec{u}\|=\sqrt{\vec{u}^2}=\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=AB$.
- $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}.\vec{v}=0$.
- $\vec{u}.\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos\left(\vec{u},\vec{v}\right)$ ou $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB\times AC\times\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$

Propriétés

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace $(\mathcal{E})$; $\alpha\in\mathbb{R}$ on a :

Linéarité du produit scalaire :

$$\begin{cases}\vec{u}.\left(\vec{v}+\vec{w}\right)=\vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w} \text{ et } \left(\vec{v}+\vec{w}\right).\vec{u}=\vec{v}.\vec{u}+\vec{w}.\vec{u}\\ \vec{u}.\left(\alpha\vec{v}\right)=\left(\alpha\vec{u}\right).\vec{v}=\alpha\left(\vec{u}.\vec{v}\right)\end{cases}$$

Base et repère orthonormé

- $\left(\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ est une base de l'espace $(\mathcal{E})$ équivaut à $\vec{i}$ et $\vec{j}$ et $\vec{k}$ ne sont pas coplanaires $\left(\det\left(\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)\neq 0\right)$
- Prenons un point O de l'espace $(\mathcal{E})$ le quadruplé $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ est appelé repère de $(\mathcal{E})$
- Si $\vec{k}.\vec{j}=\vec{k}.\vec{i}=\vec{j}.\vec{i}=0$ et $\|\vec{j}\|=\|\vec{i}\|=\|\vec{k}\|=1$ alors :
  - ❖ la base $\left(\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ est une base orthonormée de l'espace .
  - ❖ le repère $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ est un repère orthonormé de l'espace .

Le reste de ce chapitre ; on considère l'espace $(\mathcal{E})$ est muni d'un repère orthonormé $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$.







On prend $\vec{u}(x,y,z)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ et $\vec{v}(x',y',z')=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$ et $M(x,y,z)$ et $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$ et $C(x_C,y_C,z_C)$

Expression analytique de $\vec{u}.\vec{v}$


- Le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est : $\vec{u}.\vec{v}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}=xx'+yy'+zz'$.
- La norme du vecteur $\vec{u}$ est : $\|\vec{u}\|=\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
- La distance AB est : $AB=\sqrt{\left(x_B-x_A\right)^2+\left(y_B-y_A\right)^2+\left(z_B-z_A\right)^2}$.

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع


Madarisy.com : مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي
Benmoussa Mohammed

Conséquence	Ensemble des points $M(x,y,z)$ tel que : $\overrightarrow{AM}.\vec{u}=k$ avec $\vec{u}(a,b,c)$; $(\vec{u}\neq\vec{0})$ c.à.d. $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ est un plan a pour équation de la forme $ax+by+cz+d=0$
Le plan $P(A,\vec{n})$	• Tout vecteur $\vec{n}$ non nul sa direction est perpendiculaire au plan (P) s'appelle vecteur normal au plan (P). • $\vec{n}$ est normale au plan $P(A,\vec{u},\vec{v})$ alors $\vec{n}\perp\vec{u}$ et $\vec{n}\perp\vec{v}$. • Si $\vec{n}$ est normale au plan (P) et passe par A le plan (P) est noté par $P(A,\vec{n})$ • L'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ qui vérifie $ax+by+cz+d=0$ avec $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ est le plan tel que un vecteur normal est $\vec{n}(a,b,c)$. • Ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ qui vérifie $\overrightarrow{AM}.\vec{n}=0$ et $\vec{n}\neq\vec{0}$ est le plan qui passe par A et le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur normal à ce plan. • Donc tout plan $P(A,\vec{n}(a,b,c))$ a pour équation cartésienne de la forme $ax+by+cz+d=0$ la réciproque est vraie avec $(a,b,c)\neq(0,0,0)$.
Distance d'un point à un plan	$AH=d(A,(P))=\dfrac{\lvert ax_A+by_A+cz_A+d\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ avec $A(x_A,y_A,z_A)$ et $(P):ax+by+cz+d=0$ 
Parallélisme et orthogonalité de deux plans	$(P_1):ax+by+cz+d=0$ et $(P_2):a'x+b'y+c'z+d'=0$ $(P_2)\parallel(P_1)\Leftrightarrow$ ($\vec{n}$ et $\vec{n'}$ sont colinéaires) $(P_2)\parallel(P_1)\Leftrightarrow\dfrac{a}{a'}=\dfrac{b}{b'}=\dfrac{c}{c'}$ (non nuls) $(P_2)\parallel(P_1)\Leftrightarrow\Delta_x=\Delta_y=\Delta_z=0$ ($\vec{n}$ et $\vec{n'}$)  $(P_2)\perp(P_1)\Leftrightarrow\vec{n'}.\vec{n}=0$ 
Parallélisme et orthogonalité d'une droite et un plan	$P(B,\vec{n})$ et $D(A,\vec{u})$ et $(P):ax+by+cz+d=0$ $(D)\parallel(P)\Leftrightarrow\vec{u}.\vec{n}=0$ $(D)\perp(P)\Leftrightarrow$ ($\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires)  
Etude analytique d'une sphère	
Définition	Ω est un point donné de l'espace $(\mathscr{E})$ et $R>0$ l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ tel que $\Omega M=R$ s'appelle le sphère de centre Ω et de rayon R on note (S) ou $S(\Omega,R)$. Equation cartésienne de $(S)=S(\Omega(a,b,c),r)$ est : $M(x,y,z)\in(S)\Leftrightarrow\Omega M=R\Leftrightarrow(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2=R^2$ ou bien : $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ avec $d=a^2+b^2+c^2-R^2$ 

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

	Ω est le milieu de $[AB]$; $[AB]$ est un diamètre du sphère (S) donc A et B appartiennent à (S) On dit la sphère de diamètre $[AB]$ on note (S) ou $S_{[AB]}$. Equation cartésienne de $S_{[AB]}$ est : $M(x,y,z) \in S_{[AB]} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0$ ou bien $(x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)+(z-z_A)(z-z_B)=0$	
Ensemble des $M(x,y,z)$	L'ensemble des $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ tel que $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$ avec a et b et c et d de $\mathbb{R}$ on pose $A=a^2+b^2+c^2-4d$ est : • $(E)=\varnothing$ si $A<0$. • $(E)=\left\{\Omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right)\right\}$ si $A=0$. • Le Sphère $(E)=S\left(\Omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right),R=\frac{\sqrt{A}}{2}\right)$ si $A>0$.	

Intersection d'un plan (P) et une sphère (S)

3ième cas	2ième cas	1er cas
		
3ième CAS : $d=\Omega H<R$ on a $(P)\cap(S)=(C)$ (P) coupe (S) suivant le cercle de centre H et de rayon $R_C=\sqrt{R_S{}^2-d^2}$ $R_C=r$ et $R_S=R$	2ième CAS : $d=\Omega H=R$ on a $(P)\cap(S)=\{H\}$ (P) et (S) sont tangents en H avec $(H\Omega)\perp(P)$	1ER CAS : $d=\Omega H>R$ on a $(P)\cap(S)=\varnothing$ (P) et (S) son disjoints

Remarques :

- H est la projection de Ω sur (P) et $d=\Omega H=d(\Omega,(P))=\dfrac{|ax_\Omega+by_\Omega+cz_\Omega+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$
- on détermine H par l'intersection du plan (P) et la droite (D) perpendiculaire au plan passant par Ω

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع




Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي
Benmoussa Mohammed



- Vecteur normal $\vec{n}$ au plan (P) est un vecteur directeur de la droite (D)

Théorème : par un point A quelconque d'une sphère (S) il existe un et un seul plan (Q) tangente au sphère (S) au point A . l'équation de (Q) est : $M \in (Q) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{A\Omega} = 0$

Intersection d'une droite (D) et une sphère (S)

3ième CAS :	2ième CAS	1ER CAS :
		
3ième CAS : $(D)\cap(S)=\{A,B\}$	2ième CAS / $(D)\cap(S)=\{H\}$	1ER CAS : $(D)\cap(S)=\varnothing$
(D) coupe (S) en deux points A et B (Deux points mais pas le segment $[AB]$)	(D) et (S) sont tangents en H avec $(H\Omega)\perp(D)$	(P) et (S) son disjoints
CONDITION : $d=\Omega H<R$	CONDITION : $d=\Omega H=R$	CONDITION : $d=\Omega H>R$

REMARQUE :

Remarques :

- H est la projection de Ω sur (D) .
- Si $(D)=D(K,\vec{u})$ on a $d=\Omega H=\dfrac{\left\|\overrightarrow{K\Omega}\wedge\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ (voir chapitre produit vectoriel) .

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع