Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

Corrigé de l'exercice 1 :

Soit n un élément de $\mathbb{N}$

On a : $u_n = 1-\frac{1}{3}\left(1+\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)^2+.....+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right)$

Et puisque : $1+\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)^2+.....+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\left(\frac{1}{3}\right)}=\frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)=\frac{3}{2}-\frac{3}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$

Alors : $u_n = 1-\frac{1}{3}\left(\frac{3}{2}-\frac{3}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$

On a : $-1<\frac{1}{3}<1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n=0$

Et par suite : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\frac{1}{2}$

Corrigé de l'exercice 2 :

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{5n^2+3}{2n-7}=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2\left(5+\frac{3}{n^2}\right)}{n\left(2-\frac{7}{n}\right)}=\lim\limits_{n\to+\infty} n\times\frac{5+\frac{3}{n^2}}{2-\frac{7}{n}}=+\infty$

Car : $\lim\limits_{n\to+\infty} n=+\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3}{n^2}=0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{7}{n}=0$

2. Soit n un élément de $\mathbb{N}$

On a : $\frac{7n-1}{5n+3}\le u_n\le\frac{7n+1}{5n+3}$ (car $-1\le(-1)^n\le 1$)

Puisque $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{7n-1}{5n+3}=\frac{7}{5}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{7n+1}{5n+3}=\frac{7}{5}$

Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\frac{7}{5}$

3. On a , pour tout n de $\mathbb{N}$: $-1\le\cos(n)\le 1$ et $n^2+3>0$

Donc : $(\forall n\in\mathbb{N})\quad\frac{-1}{n^2+3}\le u_n\le\frac{1}{n^2+3}$

Puisque $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{-1}{n^2+3}=0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2+3}=0$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي

Et par suite : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$

4. Soit n un élément de $\mathbb{N}^*$

Pour tout k de $\mathbb{N}$ tel que $1 \le k \le n$, on a :

$$\begin{aligned} 1 \le k \le n &\Leftrightarrow 1+n^2 \le k+n^2 \le n+n^2 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{1+n^2} \le \sqrt{k+n^2} \le \sqrt{n+n^2} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n+n^2}} \le \frac{1}{\sqrt{k+n^2}} \le \frac{1}{\sqrt{1+n^2}} \end{aligned}$$

Donc : $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n+n^2}} \le \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+n^2}} \le \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$

Donc : $\frac{n}{\sqrt{n+n^2}} \le u_n \le \frac{n}{\sqrt{1+n^2}}$

Puisque : $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{n+n^2}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{n^2}{n+n^2}} = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{1+n^2}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{n^2}{1+n^2}} = 1$

Alors : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$

5. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3^n+5^n}{3^n+4\times5^n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{5^n\left(\frac{3^n}{5^n}+1\right)}{5^n\left(\frac{3^n}{5^n}+4\right)} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\left(\frac{3}{5}\right)^n+1}{\left(\frac{3}{5}\right)^n+4} = \frac{1}{4}$

Car : (puisque $-1 < \frac{3}{5} < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$)

Corrigé de l'exercice 3 :

1. Montrons par récurrence que : $u_n \ge 9$, pour tout n de $\mathbb{N}$

- ▷ Pour $n = 0$:
  On a $u_0 = 10$
  Donc $u_0 \ge 9$
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$
  - ○ Supposons que : $u_n \ge 9$
  - ○ Montrons que : $u_{n+1} \ge 9$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1}-9 &= \frac{17}{19}u_n+\frac{18}{19}-9 \\ &= \frac{17}{19}u_n-\frac{153}{19} \\ &= \frac{17}{19}(u_n-9) \end{aligned}$$

On a d'après l'hypothèse de récurrence : $u_n \geq 9$

Donc $u_n-9\geq 0$

Donc $\frac{17}{19}(u_n-9)\geq 0$

Donc $u_{n+1}\geq 9$

Et par suite $u_{n+1}-9\geq 0$

▷ On conclut que : $u_n \geq 9$, pour tout n de $\mathbb{N}$

2. Soit $n\in\mathbb{N}$

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1}-u_n &= \frac{17}{19}u_n+\frac{18}{19}-u_n \\ &= \frac{-2}{19}u_n-\frac{18}{19} \\ &= \frac{-2}{19}(u_n-9) \end{aligned}$$

Puisque $u_n-9\geq 0$ alors $\frac{-2}{19}(u_n-9)\leq 0$

Donc $u_{n+1}-u_n\leq 0$, pour tout n de $\mathbb{N}$

Et par suite (u_n)est décroissante .

- Puisque (u_n)est décroissante et minorée alors (u_n) est convergente .

3.

a- Soit $n\in\mathbb{N}$

On a

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1}-9 \\ &= \frac{17}{19}(u_n-9) \\ &= \frac{17}{19}v_n \end{aligned}$$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

Donc : $v_{n+1}=\frac{17}{19}v_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Et par suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q=\frac{17}{19}$ et de premier terme $v_0=u_0-9=10-9=1$

b-

On a $v_n=v_0\left(\frac{17}{19}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Donc $v_n=\left(\frac{17}{19}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

c-

▷ On a : $v_n=u_n-9$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Donc : pour tout n de $\mathbb{N}$

Et par suite : $u_n=\left(\frac{17}{19}\right)^n+9$ pour tout n de $\mathbb{N}$

▷ Puisque $-1<\frac{17}{19}<1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{17}{19}\right)^n=0$

Et par suite $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=9$

Corrigé de l'exercice 4 :

1.

▷ Pour $n=0$:

On a $u_0=3$

Donc $u_0>2$

▷ Soit $n\in\mathbb{N}$

- Supposons que : $u_n>2$
- Montrons que : $u_{n+1}>2$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1}-2 &= \frac{12-8u_n}{4-3u_n}-2 \\ &= \frac{12-8u_n-8+6u_n}{4-3u_n} \\ &= \frac{4-2u_n}{4-3u_n} \\ &= \frac{-2(u_n-2)}{4-3u_n} \end{aligned}$$

On a d'après l'hypothèse de récurrence : $u_n > 2$

Donc $u_n - 2 > 0$ et $4-3u_n < -2 < 0$

Donc $\frac{-2(u_n-2)}{4-3u_n} > 0$

Donc $u_{n+1}-2>0$

Et par suite $u_{n+1} > 2$

▷ On conclut que : $u_n > 2$, pour tout n de $\mathbb{N}$

2. a- Soit $n \in \mathbb{N}$:

on a :

▷

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1}}{u_{n+1}-2} \\ &= \frac{\frac{12-8u_n}{4-3u_n}}{\frac{12-8u_n-8+6u_n}{4-3u_n}} \\ &= \frac{12-8u_n}{4-2u_n} \\ &= \frac{-2(4u_n-6)}{-2(u_n-2)} \\ &= \frac{4u_n-6}{u_n-2} \end{aligned}$$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

▷

$$\begin{aligned} v_{n+1}-v_n &= \frac{4u_n-6}{u_n-2}-\frac{u_n}{u_n-2} \\ &= \frac{3u_n-6}{u_n-2} \\ &= \frac{3(u_n-2)}{u_n-2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Donc , $v_{n+1}-v_n=3$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Et par suite (v_n) est une suite arithmétique de raison $r=3$ et de premier terme

$$v_0=\frac{u_0}{u_0-2}=\frac{3}{3-2}=3$$

b- On a : $v_n=v_0+nr$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Donc : $v_n=3+3n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

c-

▷ Soit $n\in\mathbb{N}$

On a :

$$\begin{aligned} v_n=\frac{u_n}{u_n-2} &\Leftrightarrow u_nv_n-2v_n=u_n \\ &\Leftrightarrow u_nv_n-u_n=2v_n \\ &\Leftrightarrow u_n(v_n-1)=2v_n \\ &\Leftrightarrow u_n=\frac{2v_n}{v_n-1} \end{aligned}$$

Donc $u_n=\dfrac{2(3+3n)}{(3+3n)-1}$

Et par suite : $u_n=\dfrac{6+6n}{2+3n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

▷ $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{6+6n}{2+3n}=2$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

Corrigé de l'exercice 5 :

1. Montrons par récurrence que : $u_n \geq 1$, pour tout n de $\mathbb{N}$

▷ Pour $n=0$:

On a $u_0 = 2$

Donc $u_0 \geq 1$

▷ Soit $n \in \mathbb{N}$

- Supposons que : $u_n \geq 1$
- Montrons que : $u_{n+1} \geq 1$

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 1 &= \frac{7u_n + 2}{2u_n + 7} - 1 \\ &= \frac{7u_n + 2 - 2u_n - 7}{2u_n + 7} \\ &= \frac{5u_n - 5}{2u_n + 7} \\ &= \frac{5(u_n - 1)}{2u_n + 7} \end{aligned}$$

On a d'après l'hypothèse de récurrence : $u_n \geq 1$

Donc $u_n - 1 \geq 0$ et $2u_n + 7 \geq 9 > 0$

Donc $\frac{5(u_n - 1)}{2u_n + 7} \geq 0$

Donc $u_{n+1} - 1 \geq 0$

Et par suite $u_{n+1} \geq 1$

▷ On conclut que : $u_n \geq 1$, pour tout n de $\mathbb{N}$

2.

▷ Soit $n \in \mathbb{N}$

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{7u_n + 2}{2u_n + 7} - u_n \\ &= \frac{7u_n + 2 - 2u_n^2 - 7u_n}{2u_n + 7} \\ &= \frac{2(1 - u_n^2)}{2u_n + 7} \end{aligned}$$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

Puisque $u_n \geq 1$ alors $1-u_n^2 \leq 0$ et $2u_n+7>0$

Donc $\dfrac{2\left(1-u_n^2\right)}{2u_n+7} \leq 0$

Et par suite $u_{n+1}-u_n \leq 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$

D'où (u_n) est décroissante

▷ Puisque (u_n) est décroissante et minorée alors (u_n) est convergente

3.

a- Soit $n \in \mathbb{N}$

On a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}+1} \\ &= \frac{\dfrac{7u_n+2}{2u_n+7}-1}{\dfrac{7u_n+2}{2u_n+7}+1} \\ &= \frac{7u_n+2-2u_n-7}{7u_n+2+2u_n+7} \\ &= \frac{5u_n-5}{9u_n+9} \\ &= \frac{5}{9}\times\frac{u_n-1}{u_n+1} \\ &= \frac{5}{9}v_n \end{aligned}$$

Donc $v_{n+1}=\dfrac{5}{9}v_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Et par suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q=\dfrac{5}{9}$ et du premier terme

$v_0=\dfrac{u_0-1}{u_0+1}=\dfrac{2-1}{2+1}=\dfrac{1}{3}$

b- On a $v_n=v_0\left(\dfrac{5}{9}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Donc $v_n=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{5}{9}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

c-

▷ Soit $n \in \mathbb{N}$

On a :

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

$$v_n=\frac{u_n-1}{u_n+1} \Leftrightarrow u_nv_n+v_n=u_n-1$$
$$\Leftrightarrow u_n-u_nv_n=v_n+1$$
$$\Leftrightarrow u_n(1-v_n)=v_n+1$$
$$\Leftrightarrow u_n=\frac{v_n+1}{1-v_n}$$

Donc $u_n=\dfrac{\frac{1}{3}\left(\frac{5}{9}\right)^n+1}{1-\frac{1}{3}\left(\frac{5}{9}\right)^n}$, pour tout n de $\mathbb{N}$

▷ Puisque $-1<\frac{5}{9}<1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{9}\right)^n=0$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{3}\left(\frac{5}{9}\right)^n+1}{1-\frac{1}{3}\left(\frac{5}{9}\right)^n}=1$

Corrigé de l'exercice 6 :

1. On a f est dérivable sur $I=[0,1]$

Soit $x\in I=[0,1]$:

On a : $f'(x)=\left(\dfrac{4x+3}{3x+4}\right)'=\dfrac{\begin{vmatrix}4&3\\3&4\end{vmatrix}}{(3x+4)^2}$

Donc : $f'(x)=\dfrac{7}{(3x+4)^2}$ pour tout x de $I=[0,1]$

Puisque : $f'(x)>0$ pour tout x de $I=[0,1]$ alors f est strictement croissante sur $I=[0,1]$

2. On a : f est continue et strictement croissante sur $I=[0,1]$

Donc $f(I)=f([0,1])=[f(0),f(1)]=\left[\dfrac{3}{4},1\right]$

Et par suite $f(I)\subset I$

3. Soit $x\in I=[0,1]$:

On a :

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

$$f(x)-x = \frac{4x+3}{3x+4}-x$$
$$= \frac{4x+3-3x^2-4x}{3x+4}$$
$$= \frac{3(1-x^2)}{3x+4}$$

On a : $x\in I=[0,1]$ donc $1-x^2\geq 0$ et $3x+4>0$

Donc $\frac{3(1-x^2)}{3x+4}\geq 0$

Donc $f(x)-x\geq 0$ pour tout x de $I=[0,1]$

Et par suite (C_f) est au-dessus de $(\Delta): y=x$ sur $I=[0,1]$

4.

a- Montrons que : $0\leq u_n\leq 1$, pour tout n de $\mathbb{N}$

▷ Pour $n=0$:

On a : $u_0=\frac{1}{2}$

Donc : $0\leq u_0\leq 1$

▷ Soit $n\in\mathbb{N}$

- Supposons que $0\leq u_n\leq 1$
- Montrons que $0\leq u_{n+1}\leq 1$

D'après l'hypothèse de récurrence , on a $u_n\in I$

Donc $f(u_n)\in f(I)$

Donc $u_{n+1}\in f(I)$

Et puisque $f(I)\subset I$, alors $u_{n+1}\in I$

D'où $0\leq u_{n+1}\leq 1$

▷ On conclut que $0\leq u_n\leq 1$, pour tout n de $\mathbb{N}$

b- Soit $n\in\mathbb{N}$

On a $f(x)-x\geq 0$ pour tout x de $I=[0,1]$

Et comme $u_n\in I$, alors $f(u_n)-u_n\geq 0$

Donc $u_{n+1}-u_n\geq 0$, pour tout n de $\mathbb{N}$

D'où (u_n) est croissante

c- On a : $u_0=\frac{1}{2}\in I$ et $u_{n+1}=f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

▷ f est continue sur $I=[0,1]$

▷ $f(I)\subset I$

▷ Puisque (u_n) est croissante et majorée alors elle est convergente

Donc la limite de (u_n) est solution de l'équation $f(x)=x$

Et on a : $f(x)=x \quad \Leftrightarrow \quad x=-1 \quad ou \quad x=1$

Puisque $0\le u_n\le 1$, alors $0\le \lim\limits_{n\to+\infty} u_n\le 1$

D'où $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=1$

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع